

ДИПАНА®

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного
препарата для медицинского применения
ДИПАНА®

Регистрационный номер: ЛС-001751

Торговое название: ДИПАНА®

Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

Состав:

Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, в качестве активных ингредиентов содержит сухие водные экстракты следующих растений:

Пикроризы курроа (Picrorhiza Kurroa Benth.).....	80 мг
Андрографиса метельчатого (Andrographis paniculata Nees.).....	40 мг
Эклипты белой (Eclipta alba Hassk.).....	40 мг
Филлантуса нирури (Phyllanthus niruri L.).....	40 мг
Паслена черного (Solanum nigrum L.).....	30 мг
Тиноспоры сердцелистной (Tinospora cordifolia Miers.).....	30 мг
Иссопа водного (Vasora monnieri Linn.).....	10 мг
Берхавии раскидистой (Boerhaavia diffusa L.).....	10 мг
Имбиря лекарственного (Zingiber officinale Roscoe).....	10 мг
Перца длинного (Piper longum L.).....	8 мг

Вспомогательные компоненты

Крахмал кукурузный высушенный 60,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая 170,0 мг, тальк 7,5 мг, магния стеарат 5,0 мг, карбоксиметилкрахмал натрия 5,0 мг, кроскармеллоза натрия 5,0 мг, натрия лаурилсульфат 2,5 мг, метилпарагидроксибензоат натрия 1,5 мг, пропилпарагидроксибензоат натрия 0,5 мг, натрия бензоат 2,0 мг, бронопол 0,12 мг.

Состав оболочки

- Пленочное покрытие «Опадрай II белый» («Opadry II white 85G568918») - 9,50 мг (лецитин (соя), диоксид титана, полиэтилен гликоль/макрогол, тальк, поливиниловый спирт).
- Пленочное покрытие «Опадрай II зелёный» («Opadry II Green 85G51606») - 21,50 мг (полиэтиленгликоль, FD&C синий №1 алюминиевый лак, лецитин, поливиниловый спирт, диоксид титана, тальк, хинолиновый жёлтый алюминиевый лак).
- Вода очищенная (испаряется в процессе производства).

Описание

Продолговатые, двояковыпуклые, с закругленными концами таблетки, покрытые пленочной оболочкой светло-зеленого цвета, со специфическим запахом, на изломе серого цвета, с черными, коричневато-черными пятнами.

Фармакотерапевтическая группа

Гепатопротекторное средство растительного происхождения.

Код АТХ: А05ВА

Фармакологическое действие

Комплекс биологически активных веществ растительного происхождения, входящих в состав препарата Дипана®, предохраняет печень от воздействия токсичных веществ (алкоголь, лекарственные препараты и т. д.), стимулирует регенерацию клеток печени; нормализует белковосинтетическую функцию печени; способствует улучшению процесса пищеварения.

Дипана® содержит сухие водные экстракты растений, обладающие следующим действием:

Экстракты корневищ Пикроризы курроа, листьев и цветов Андрографиса метельчатого обладают гепатопротективным действием, предотвращая поражение печени токсическими веществами и лекарственными препаратами.

Экстракт листьев и плодов Паслена черного активизирует детоксикационную функцию печени, оказывая стимулирующее влияние на ферментные системы митохондрий гепатоцитов.

Экстракт листьев Иссопа водного, корней и листьев Эклипты белой обладают антиоксидантной активностью, в числе прочего улучшая общее самочувствие пациентов.

Экстракт корней Берхавии раскидистой улучшает отток желчи.

Экстракты корней и листьев Филлантуса нирури и стеблей Тиноспоры сердцелистной обладают иммуномодулирующей активностью.

Экстракт корневищ Имбиря лекарственного – уменьшает диспепсические расстройства, нормализует перистальтику кишечника и желчевыводящих протоков.

Экстракт плодов Перца длинного – предотвращает развитие фиброза печени, потенцирует терапевтическое действие компонентов, входящих в состав остальных экстрактов

Показания к применению

- острые и хронические инфекционные, токсические и лекарственные гепатиты в комплексной терапии;
- алкогольная болезнь печени;
- жировая дистрофия печени различной этиологии;
- цирроз печени в комплексной терапии;
- профилактически при хронических интоксикациях (в т. ч. при длительном употреблении алкоголя);
- гипомоторная дискинезия желчевыводящих путей.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания.

Учитывая отсутствие опыта применения препарата у детей младше 10 лет, не рекомендуется использование данного препарата у этой возрастной группы.

Способ применения и дозы

Внутрь. Таблетки Дипана® следует принимать до приема пищи или жидкости, запивая достаточным количеством воды.

Показание	Количество таблеток в один прием	Кратность приема в день	Продолжительность курса лечения
При лечении алкогольной болезни печени, жировой дегенерации	2-3 таблетки	2 раза в день	8-12 недель
При лечении гепатитов, при токсических и лекарственных поражениях, циррозе печени	2 таблетки	3 раза в день	4-8 недель
При гипомоторной дискинезии желчевыводящих путей	1-2 таблетки	3 раза в день	4-8 недель
Для профилактики поражений печени при хронических интоксикациях	1-2 таблетки	3 раза в день	4-8 недель

Побочные эффекты

Возможны аллергические реакции.

В отдельных случаях наблюдаются следующие преходящие явления: сухость во рту, тошнота, спазмы кишечника, диарея, нарушение сна, головные боли, усиление диуреза.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и механизмами

Препарат не влияет на способность к управлению транспортными средствами и механизмами.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой

По 12 таблеток в блистере. 4 блистера в картонной упаковке вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25°C, в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Производитель

Сентисс Фарма Пвт. Лтд.

212/Д-1, Грин Парк, Нью Дели, Индия.

Адрес для направления претензий:

ООО «Сентисс Рус»

111033, Москва, Золоторожский вал, д.11, стр.21

тел.: (495) 229-76-63, факс: (495) 229-76-64

DPT/910/PI/RU/06